

Chabot



Chabot

Ordre: Scorpaeniformes

Famille: Cottidae

Genre: Cottus

Nom: Cottus gobio

Biométrie:

Taille: 10 à 15 cm, maxi 18 cm

Poids: 40 g, maxi 80 g

Longévité: 4 à 5 ans

Caractéristiques:

Corps en forme de massue, dépourvu d'écailles, avec une large tête surdimensionnée. Grande bouche aux lèvres épaisses ; mâchoires et vomer munis de petites dents râpeuses ; yeux haut placés ; opercules armés d'une forte épine recourbée vers l'arrière ; nageoires ventrales placées très en avant, très grandes nageoires pectorales. Deux nageoires dorsales, celle antérieure comportant des rayons épineux. La ligne latérale parcourt le milieu des flancs jusqu'à la fin du pédoncule caudal ; elle est garnie de 30 à 35 petites écailles. Absence de vessie natatoire.

Coloration:

Coloration de fond très variable selon le milieu ; dos et flancs de noir à brun foncé jusqu'à gris, en partie irrégulièrement tachetés, ventre plus clair.

Mœurs:

Poisson benthique se tenant caché sous les pierres et les racines durant le jour et ne partant à la recherche de nourriture qu'au crépuscule et de nuit. Se nourrit alors surtout d'organismes benthiques, mais aussi d'œufs, de poissons et d'alevins. La période de reproduction s'étend de février à mai ; nombre d'œufs : environ 200 à 300 d'un diamètre de 2 à 2,5 mm. La femelle dépose ses œufs, de couleur jaune à orange, en boules qui adhèrent aux pierres, le mâle les surveille jusqu'à l'éclosion. L'éclosion a lieu après 3 à 6 semaines ; les jeunes croissent très rapidement.

Alimentation:

Petits animaux vivant au fond de l'eau, frai et alevins de poissons.



Intérêt de pêche:

Il n'y a aucun intérêt à pêcher le chabot. Au contraire, c'est un poisson que l'on capture par accident et qui, au vu de sa fragilité doit être précautionneusement remis à l'eau. Plusieurs espèces de chabot sont des espèces menacées et étant donné sa prédisposition à être un indicateur de la propreté des eaux, ce petit poisson doit être protégé.