


# Vandoise



## Caractéristiques:

Poisson à corps plus ou moins étiré selon les régions, de section pratiquement ronde. La petite tête porte une bouche étroite, légèrement infère. Grandes écailles, 47 à 53 le long de la ligne latérale. La nageoire dorsale comporte 10-11 rayons, la nageoire anale en a 10-12 ; la queue est fourchue. Dents pharyngiennes sur 2 rangées 2.5-5.2(3)

## Coloration:

Dos sombre à reflets bleutés; flancs jaunâtres et argentés ; face ventrale blanchâtre. Les nageoires pectorales, pelviennes et anales sont de teinte jaunâtre à orangé. La ligne latérale est souvent bordée en dessous et en dessus d'une bande sombre

## Mœurs:

Poisson de surface vivant en bancs, qui passe pour être l'un des meilleurs nageurs parmi les cyprinidés. La période de frai se déroule en avril-mai. Les mâles ont alors sur tout le corps un tubercule nuptial finement granuleux. Les œufs d'environ 2 mm adhèrent aux plantes aquatiques et aux pierres. La maturité sexuelle intervient au bout de la 3<sup>ème</sup> année.

## Alimentation:

Plancton, vers, gastéropodes, larves d'insectes, insectes aquatiques et aériens, plus rarement quelques débris végétaux.

## Vandoise

**Ordre:** Cypriniformes

**Famille:** Cyprinidae

**Genre:** Leuciscus


**Nom:** Leuciscus leuciscus

**Biométrie:**

Taille: 15 à 20 cm, maxi 30 cm

Poids: 100 à 200 g, maxi 1 kg

**Longévité:** 10 à 12 ans, maxi 16 ans



## Intérêt de pêche:

Poisson méfiant, il faut utiliser un fil très fin. Sa pêche se fait à l'aide d'insectes naturels ou de mouches artificielles. La pêche au coup ou à la mouche sont les techniques les plus utilisées pour pêcher la vandoise. La vandoise est fréquemment utilisée comme vif.